

**El cáncer de cuello uterino se puede prevenir. Recibir la vacuna contra el HPV, hacerse la prueba del HPV y hacerse pruebas de Papanicolaou de rutina pueden salvar vidas, posiblemente la suya.**

### ¿Quién está en riesgo?

Casi todos los cánceres de cuello uterino son causados por el HPV, un virus habitual que se transmite a través del sexo. La infección por HPV es tan frecuente que la mayoría de las personas la padecerán en algún momento de sus vidas. Fumar tabaco también aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino.

Su proveedor puede ayudarla a evaluar su nivel de riesgo considerando su edad, historial médico personal y su estilo de vida; y puede identificar las pruebas de detección o las vacunas que necesita.

**combata  
el cáncer.**



### **PUEDE reducir su riesgo de cáncer de cuello uterino:**

- Reciba la vacuna contra el HPV, si es elegible;
- Hágase pruebas periódicas de Papanicolaou y HPV; y
- Deje de fumar tabaco (¡podemos ayudar!).

### **Vacúnese y hágase pruebas de detección, y conozca estas señales:\***

- La vacuna contra el HPV se recomienda para preadolescentes y todas las personas menores de 26 años que aún no la hayan recibido.
- Los adultos entre 27 y 45 años pueden ser elegibles para recibir la vacuna. Pregúntele a su médico.
- Hágase pruebas periódicas de Papanicolaou y hágase la prueba del HPV.
- Sangrado o secreción de la vagina que no es normal para usted, como sangrado después de tener relaciones sexuales o entre períodos.
- Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales.
- Cambios en las deposiciones.

*Estos síntomas pueden estar presentes con condiciones que **no** son cáncer.*  
Si nota alguno de estos síntomas, llame a su proveedor de atención médica de inmediato.

\*Al principio, es posible que el cáncer de cuello uterino no cause síntomas perceptibles, razón por la que las pruebas de detección son tan vitales.

*Obtenga más información sobre la vacuna contra el HPV y cómo protege del cáncer. Use este QRC para ver un video. —>*

